乳幼児期の教育の大切さと場の働き

多賀 徹太郎

東京大学大学院教育学研究科

生きている状態とは？

生命とは何か

物理的にみた生細胞

シュレーディンガー 著

岡 小天・鎮目恭夫 訳

量子力学を創造し、原子物理学の基礎をつくった著者が追究した生命の本質——分子生物学の生みの親となった20世紀の名著。生物の現象ごとに遺伝のしくみと染色体行動における物質の構造と法則を物理学と化学で説明し、生物におけるその意義を究明する。負のエントロピー論など今も熱い議論の渦中にある科学者の本懐を示す古典。

青 946-1
岩波文庫

ヒトの脳・身体—複雑なシステム：

- ・ 要素は自律的に活動を生成する
- ・ 開放系 物質やエネルギーの流れ
- ・ 非線形相互作用を通じた自己組織
- ・ 自ら新たな情報を作る

生きている

発達：

- ・ 自発的に自らの形態と機能を作る
- ・ 環境と相互作用しながら発展
- ・ 自己の形成
- ・ 人間になること

生きていく

共生：

- ・ 自然・生物・社会環境との相互作用
- ・ 場の形成

生かされる

- 1 人間の脳はいかにできるか
- 2 個の成立
- 3 世界との共生
- 4 進化を駆動する発達
- 5 人間形成を捉え直す

- 1 人間の脳はいかにできるか
- 2 個の成立
- 3 世界との共生
- 4 進化を駆動する発達
- 5 人間形成を捉え直す

胎児の発達

Carnegie Stages of Human Development

Dr Mark Hill, Cell Biology Lab, School of Medical Sciences (Anatomy), UNSW

Acknowledgements

Special thanks to Dr S. J. DiMarzo and Prof. Kohel Shiota for allowing reproduction of their research images and material from the Kyoto Collection and Ms B. Hill for image preparation.

© M.A. Hill, 2004

胎児における脳のマクロな構造とネットワークの形成

(Takahashi E et al. Cereb. Cortex 2012)

胎児における脳の形態形成とネットワーク形成の原理の追求

<放射状方向理論>

大脳皮質の成長率

脳室のプロトマップ

(Homae et al. submitted)

<接線方向理論>

測地線

長距離連合線維の形成

(Horibe, Taga, Fujimoto Cerebral Cortex 2023)

胎児から乳児へ 脳の劇的変化

遺伝子発現

サブプレートの
発達と消失

大脳の再構成

阿知波、丸山ら
(医学総合研究所)

Late fetal period: late preterm (29 to 34 PCW)
Neonatal period: the newborn at term

早産児における脳の自発活動の生成と消滅

自発活動 (EEG)の発達

ネットワーク (fNIRS)の発達

デルタブラッシュの生成と消滅

(Shiraki et al. Sleep 2025)

EEG
緑：電極
NIRS
赤：送光部
青：受光部

3ヶ月児の脳の機能分化

視覚

視覚野

(Taga et al. PNAS 2003)

聴覚

左右聴覚領域

(Taga & Asakawa
NeuroImage 2007)

言語

右側頭頭頂領域

(Homae et al. Neurosci Res 2006)

視覚オブジェクト

後頭葉外側部

(Watanabe et al.
NeuroImage 2008)

馴化脱馴化

前頭前野

(Nakano et al.
Cereb Cortex 2009)

連合学習

側頭頭頂領域

(Nakano et al.
PLoS ONE 2008)

新規脳イメージング手法の開発

従来のNIRS脳イメージング

(Taga et al. PNAS 2003)

2波長光 NIRS

組織酸素化
oxy-Hb/deoxy-Hb

Hinachi, Ltd., Central Research Laboratory

- ・神経活動 (神経細胞)
- ・脳血液酸素化 (脳毛細血管)

水輸送

→ グリンパティックシステム
 脳のメンテナンス機能を担う仕組みとして注目
 → 睡眠時に亢進
 → 睡眠の役割の解明へ

(Rasmussen et al. Physiol Rev 2022)

新規多波長NIRS脳イメージング

(Taga & Watanabe Adv Exp Med Biol, 2023)

多波長光 NIRS

組織酸素化
oxy-Hb/deoxy-Hb

酸素代謝
シトクロム酸化酵素
ox-CCO

脳脊髄液輸送
水 H₂O

- ・神経活動 (神経細胞)
- ・脳血液酸素化 (脳毛細血管)
- ・酸素代謝 (神経細胞ミトコンドリア)
- ・水輸送 (脳脊髄液)

- 1 人間の脳はいかにできるか
- 2 個の成立
- 3 世界との共生
- 4 進化を駆動する発達
- 5 人間形成を捉え直す

自発運動から目的志向運動へ

最初の胎動

(Einspieler et al.
Fetal behaviour, 2012)

胎動

ウィーン医科大学との共同研究

ジェネラルムーブメント(全身自発運動)

(Taga, Takaya and Konishi, IEEE, SMC, 1999)

ジェネラルムーブメントと発達障害

(Kanemaru et al. Dev Med Child Neurol 2013)

(Gima et al. Exp Brain Res 2018)

7.5 週齡(在胎)

18 週齡 ~

新生児

音楽リズムへの引き込み

(Fujii et al. PLoS ONE 2014)

環境との相互作用(モバイル課題)

(Watanabe et al. J. Exp Psychol

2-4 月齡(生後)

学習一個性を減らすか？個性を増やすか？

unique to
each individual

indistinguishable
from others

(Fujihira, Watanabe, Taga submitted)

長期記憶の形成・忘却・再活性

Embodied memory

(Fujihira & Taga, Psychological Rev 2025)

睡眠—覚えるためにあるのか？忘れるためにあるのか？

多波長NIRS (Taga & Watanabe Adv Exp Med Biol, 2023)
を用いて、脳活動、血流、酸素代謝、水輸送を計測
→睡眠中の乳児の脳の未知の働きを可視化

- 1 人間の脳はいかにできるか
- 2 個の成立
- 3 世界との共生
- 4 進化を駆動する発達
- 5 人間形成を捉え直す

腸内細菌との共生

- ・腸内細菌叢が脳の発達や身体の健康に重要な役割を担う
- ・共生する腸内細菌叢は動的に変化し、個性も認められる

→発達初期の腸内細菌と脳の相互作用の実態は未解明

消化管は物理的に外部である

多次元尺度法による細菌グループ占有率の縮約表現

- ・内と外の境界は？
- ・自己と他者の境界は？
- ・免疫学的自己との関連

言語の初期発達—発話が先か？知覚が先か？

発話

母音に似た音の発声

言語に特有な音の発声 初語

非言語音の発声

喃語

リズム・抑揚を基に言語を弁別

抑揚の大きな母親語を選好

韻律情報
音韻情報

音の分布の統計的学習

単語内の典型的な強弱のパターンを識別

言語に特別な音の組み合わせの認識

母国語の子音の知覚能力が向上

知覚

一般的な知覚の機構

言語に特有な機構

adapted from Clancy and Finley (2001), Kuhl (2004)

- 1 人間の脳はいかにできるか
- 2 個の成立
- 3 世界との共生
- 4 進化を駆動する発達
- 5 人間形成を捉え直す

個体発生は系統発生を繰り返す？

直立二足歩行の起源に関するネオテニー仮説

直立二足歩行の発達

新生児ステッピング(原始歩行)

(Taga et al. 1991; 多賀 2002)

神経系、身体、環境間のリズムの引き込みによる自己組織

Upright bipedal walking

(Taga 1995)

体幹の直立姿勢と下肢の運動を協調する機構の起源は？

cineMRIによる胎児(18週~満期)の自発運動計測

Trunk ex & Hip fl

Trunk fl & Hip ex

体幹伸展 & 股関節屈曲

体幹屈曲 & 股関節伸展

スイング

(Taga et al. submitted)

直立二足歩行の発達と進化

シャッフリングベビー
はいはい(四足歩行)を経由しない二足歩行
(Robson 1970)

化石類人猿(ダヌビウス)の直立二足歩行
(Böhme et al. 2019)

二足歩行の進化の原理
ネオテニー
(胎児化/幼形成熟/遅滞)
(今西 1974)

ネオテニー

発達を遅らせることで、胎児的な形態を維持

図61 チンパンジーのこどもとおとな(ナエフ 1926bより)。ナエフは「私が知っている動物写真の中では、これがいちばん人間に似ている」(p.448)と記している。

「個体発生初期の段階は、実現可能な適応の宝庫である。なぜなら、そこにはまだ、その後のアロメトリーによって失われてしまう形態や構造が無数に含まれているからである。」

ゲールド「個体発生と系統発生」(1987)

自己家畜化 (Self-domestication)

- ・ 攻撃性の低下
- ・ 向社会性
- ・ 幼若期の延長

(Theofanopoulou et al. PlosOne 2017)

頭部形態の急激な変化？

反短頭化

cephalic index

(Lee et al. in preparation)

人間形成の基礎メカニズム

脳・身体・環境のダイナミクス

実時間スケール

睡眠 覚醒

発達時間スケール

システム	10週 胎児	0 出生	3 乳児	6ヶ月
脳				
サブプレート	自発活動			
皮質層		機能的活動		
白質繊維		構造的ネットワーク		
シナプス結合			機能的ネットワーク	
運動		自発運動	目的志向運動	
睡眠				
睡眠状態		動睡眠		静睡眠
脳波 (EEG)		デルタブラッシュ		紡錘波
記憶				経験の記憶
発声		非言語音 自発的発声		クーイング 母音様発声 喃語
腸内細菌				

進化時間スケール

形態

- 1 人間の脳はいかにできるか
- 2 個の成立
- 3 世界との共生
- 4 進化を駆動する発達
- 5 人間形成を捉え直す

人間形成の新しい哲学が必要

環境決定論 / 自己決定論
二元論 / 非二元論

自発性を基盤とする個性と共生の創発の
理解に寄与すると考えられる著作

ギリシャ哲学
プラトン、アリストテレス
心身二元論
環境決定論
因果律

東洋哲学
心身一元論
存在論
関係性

合理主義哲学
デカルト
心身二元論
身体機械論

人間論
アキナス
心と物の非分離
自己決定論
自律性

進化論
ダーウィン
環境による選択

現象学
ブレンターノ、フッサール、
ハイデガー、メルロポンティ
志向性

サイバネティクス

プラグマティズム
デューイ
教育、自発性

情報科学

生物学

自己組織理論

心理学

複雑系理論

人工知能

神経科学

進化発生生物学

「魂は身体という物体の動源である。それは然し、動く(=動かされる)ことなくして動かすものではない。その理由の一つとしては何ものも自ら動いている(=動かされている)ことなしには動かすことはできないと考えられる。」
トマス・アキナス(神学大全 第75問題)

「教育は内部からの発達であるという考え方と、外部からの形成であるという考え方との間にみられる対立によって特徴づけられている。」
デューイ(経験と教育 1928)

「生きている系は秩序の自己形成系である。情報発現系は、自己形成系の一形態である。」
清水博(生命を捉え直す 1978)

「神経活動のこの唯一の根源は、子宮の内部で、胎児がその最初の志向性の発現として無目的に手足を動かすことにおいて、初めてその姿を現します。」
ウォルター・J・フリーマン
(脳はいかにして心を創るのか 1999)

「私たち生物は、いまだかつて個体として存在したことはない。」
スコット・ギルバート
(A symbiotic view of life 2012)

自発性を基礎とするか、感覚・理性を基礎とするかで、
全く異なる哲学へと至る